


*Perca fluviatilis* - Linnaeus, 1758

De Baars heeft twee gescheiden rugvinnen, waarvan de voorste met harde stekels en een zwarte vlek. Over de flanken lopen zes tot acht donkere banden. De rug is groenbruin, op de flanken overgaand in lichtbruin tot geel of goudkleurig. Afhankelijk van de vindplaats en de grootte verschillen de kleuren.

Karper




*Cyprinus carpio* - Linnaeus, 1758

De karper varieert in kleur, vorm en manier waarop de schubben op het lijf zitten en heeft vier tastdraden om de bek: twee grote bij de mondhoeken, twee kleinere op de bovenlip. De rugvin is lang en hol

ingesneden. Een volledig beschubte karper van het "wildtype" heeft 35 tot 40 schubben op de zijlijn. De vis kan in gevangenschap tientallen jaren oud worden.

De wilde uitgangsvorm van de karper is volledig beschubt. Er zijn echter gekweekte karpervariëteiten, waarbij de schubben volledig ontbreken ('naaktkarper'), met rijen grote schubben op de zijlijn ('rijenkarper') of met onregelmatig over het lijf voorkomende schubben van verschillend formaat ('spiegelkarpers'). Al deze variëteiten kunnen bovendien voorkomen met de kleur van een goudvis ('goudkarpers'). Een wilde, slanke, geschubde variëteit wordt wel 'boerenkarper' genoemd. Deze vis is mogelijk de nakomeling van uitzettingen in de Middeleeuwen. Nakomelingen van recenter uitgezette wildtypes kunnen echter ook deze vorm aannemen. Biologisch behoren deze karpers alle tot de soort karper *C. carpio*.

## Brasem



### *Abramis brama* - Linnaeus, 1758

De brasem is een grijsbruin gekleurde karperachtige vis, met zilverkleurige flanken die bij het groter worden meer bronskleurig worden. De brasem, zeker de kleine, kan verward worden met de kolblei. De brasem heeft 12-14 schubben tussen rugvin en zijlijn (kolblei 8-10), een kleiner oog en een ver uitstulpbare bek. De vis kan 90 cm worden.

## Bittervoorn




*Rhodeus sericeus* - Pallas, 1776

De bittervoorn is een kleine maar stevige karperachtige vis. Een opvallend kenmerk is de horizontale, glimmende blauwgroene streep op de flanken vanaf de staartwortel. De schubben zijn relatief groot (34 tot 30 op de zijlijn).

## Bliek - kolblei

Bliek - Kolblei



*Blicca bjoerkna* - Linnaeus, 1758

De kolblei lijkt op de brasem, de vis is echter wat lichter gekleurd en de vinnen neigen naar roodachtig. Het doorslaggevende verschil zit hem in het aantal schubben tussen rugvin en zijlij (7-10) en in het oog: dat is groter in diameter; aan de afstand tussen het oog en de punt van de bek (bij de brasem: kleiner)